

КТО МОЖЕТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Вакцина – это медицинский препарат для прививок против заразных болезней, который вырабатывает в организме иммунный ответ (антитела) к конкретному антигену. Вакцины могут быть профилактическими (для предотвращения или ослабления последствий будущей инфекции) или терапевтическими (например, лечебная бруцеллёзная вакцина).

Вакцина предназначена для людей от 18 лет и старше (кроме беременных женщин и женщин, которые производят грудное вскармливание). Вакцинация особенно важна для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.

При этом в первую очередь вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.

В частности, много разговоров было о том, какой именно вакциной будут прививать казахстанцев. В феврале начнется вакцинация против КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России. Далее вакцинация будет осуществляться вакциной Гам-КОВИД-Вак, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала 2021 года планируется начать вакцинацию препаратом отечественного производства - QazCovid-In, который в настоящее время находится на III фазе клинических испытаний.

Эксперты Минздрава подчеркнули также, что вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено. Перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. В случае если имеется тяжелое аллергическое заболевание, человеку дается медицинский отвод от прививки. При этом предугадать аллергическую реакцию невозможно, так как каждый организм индивидуален. В целях своевременного реагирования человеку следует оставаться под медицинским наблюдением (в стенах медучреждения) первые 30 минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно проявление аллергической реакции на вакцину

Перед вакцинацией мы проводим первичный осмотр терапевтом.

Вакцинация осуществляется в 2 этапа. Вторая вакцина вводится через 21 день после первой. Контроль состояния пациента терапевтом через 42 дня (по желанию).

Рекомендуется в течение 3-х дней: не мочить место прививки, не посещать сауну или баню, исключить алкоголь и тяжёлые физические нагрузки.



ОСТАНОВИТЬ COVID -19



ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ?



в медицинских учреждениях республики

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ НЕОБХОДИМО



заполнить анкету и согласие



пройти осмотр врача

ПЕРИОД ВАКЦИНАЦИИ

После введения вакцины:

соблюдать рекомендации врача

следить за самочувствием



Второй компонент вводится через 21 день.

После формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться до 2-х лет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ - ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА



болезненность, покраснение на месте укола



першение в горле



головная боль



кратковременное повышение температуры



заложенность носа

ВАЖНО! ДО И ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ



носить маску



носить перчатки



соблюдать социальную дистанцию

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

Самоизоляция привитым людям не требуется. Достаточно стандартных мер профилактики: маски, перчатки. Мы выдаем справку и/или сделаем запись в личный прививочный сертификат о прививке (можно предъявить по месту работы, при выезде за границ). Вместе с прививкой казахстанцы будут получать и электронные паспорта вакцинации от коронавируса. **Электронный паспорт вакцинации (ЭПВ) – это медицинская история вакцинации.** Это ключевой модуль (функциональность) в сфере здравоохранения для оказания непрерывного ведения, контроля и мониторинга вакцинируемого населения.

Есть ли побочные действия?

Вакцина – это чужеродный белок для организма, поэтому могут быть: местные реакции: боль, отёк, покраснение, уплотнения; общие реакции: повышение температуры тела, судороги; психогенные реакции (страх человека): головокружение, покалывание.

Противопоказаниями к вакцинации являются:

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты - об этом подробно уточнит терапевт перед процедурой; тяжелые аллергические реакции в прошлом; острые инфекционные и неинфекционные заболевания - в период болезни вакцину вводить противопоказано; обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии); беременность и период грудного вскармливания; так же вакцинацию не проводят людям не достигшим 18-летнего возраста.