

КОРОНОВИРУС ВАКЦИНЦИЯСЫН КІМ АЛА АЛАДЫ.

Вакцина - бұл организмде белгілі бір антигенге иммундық жауап (антиденелер) тудыратын жұқпалы ауруларға қарсы егуге арналған медициналық дайындық. Вакциналар профилактикалық (болашақ инфекцияның әсерін болдырмау немесе азайту үшін) немесе терапиялық (мысалы, бруцеллезге қарсы вакцина) болуы мүмкін.

Вакцина 18 жастан асқан адамдарға арналған (жүкті әйелдер мен емізетін әйелдерді қоспағанда). Вакцинация әсіресе созылмалы респираторлық аурулары, жүрек-қан тамырлары аурулары және қант диабеті бар адамдар үшін өте маңызды.

Бұл ретте, ең алдымен, коронавирустық инфекцияның таралу және таралу қаупі жоғары халықтың осал топтары коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинацияға ұшырайды, одан әрі иммундауға жататын қалған халық топтары қамтылады.

Атап айтқанда, қазақстандықтар қандай вакцинамен вакцинацияланатыны туралы көп айтылды. Ақпан айында CVI-ге қарсы вакцинация Ресейде өндірілген Gam-COVID-Vac (Sputnik V) вакцинасын қолдана отырып басталады. Әрі қарай вакцинация Қарағанды фармацевтикалық кешені негізінде шығарылған Gam-COVID-Vac вакцинасымен жүзеге асырылады. 2021 жылдың 2-ші тоқсанынан бастап отандық өндірісте - QazCovid-In препаратымен вакцинациялауды бастау жоспарлануда, ол қазіргі кезде III клиникалық зерттеулерде.

Денсаулық сақтау министрлігінің сарапшылары Қазақстанда вакцинация ерікті екенін баса айтты. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 77-бабына сәйкес кез-келген медициналық процедура, оның ішінде вакцинация тек вакцинацияланған адамның келісілген келісімімен жүзеге асырылады. Қазақстанда вакцинациядан бас тартқаны үшін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік жоқ.

Медицина қызметкері кез-келген вакцинациядан бұрын адамның аллергиясы бар-жоғын анықтайды. Егер ауыр аллергиялық ауру болса, адамға вакцинациядан медициналық алып тастау беріледі. Сонымен бірге аллергиялық реакцияны болжау мүмкін емес, өйткені әрбір организм жеке тұлға. Уақтылы жауап беру үшін адам вакцинация алғаннан кейін алғашқы 30 минут ішінде дәрігердің бақылауында болуы керек (медициналық мекеменің қабырғасында): дәл осы кезеңде вакцинаға аллергиялық реакция болуы мүмкін

Вакцинациядан бұрын дәрігерден кеңес алу.

Вакцинация 2 кезеңде жүзеге асырылады. Екінші вакцина біріншіден 21 күн өткен соң жасалады. 42 күннен кейін терапевт науқастың жағдайын бақылау (міндетті емес).

3 күн ішінде ұсынылады: вакцинация салған жерді суламаңыз, саунаға немесе ваннаға бармаңыз, алкоголь мен ауыр физикалық жүктемені қоспаңыз.

Вакцинациядан кейін

Вакцинацияланған адамдар үшін өзін-өзі оқшаулау қажет емес. Стандартты алдын алу шаралары жеткілікті: маскалар, қолғаптар. вакцинация алған соң куәлік беріледі және

вакцинация туралы жеке куәлікке жазба енгіземіз (оны жұмыс орнында, шетелге барғанда ұсына аласыз. Вакцинациямен қатар, қазақстандықтар да алады коронавируспен қарсы вакцинацияға арналған электрондық паспорттар. Электрондық паспорт вакцинациясы (EPV) - вакцинацияның анамнезі және вакцинацияланған халықты үнемі басқаруды, бақылауды және бақылауды қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласындағы негізгі модуль (функционалдылық).

Жанама әсерлері бар ма?

Вакцина ағзаға жат ақуыз болып табылады, сондықтан болуы мүмкін:

жергілікті реакциялар: ауырсыну, ісіну, қызару, индурация;

жалпы реакциялар: дене температурасының жоғарылауы, құрысулар;

психогендік реакциялар (адамның қорқынышы): айналуы, шаншу

Вакцинацияға қарсы көрсеткіштер:

Вакцинаның кез-келген компонентіне немесе құрамында ұқсас компоненттері бар вакцинаға жоғары сезімталдық - терапевт бұл процедурадан бұрын егжей-тегжейлі түсіндіреді;

өткен кезеңдегі ауыр аллергиялық реакциялар;

жедел жұқпалы және жұқпалы емес аурулар - ауру кезеңінде вакцина қарсы;

созылмалы аурулардың өршуі (вакцинация сауыққаннан немесе ремиссиядан кейін 2-4 аптадан ерте өткізіледі);

жүктілік және емізу кезеңі;

сонымен қатар 18 жасқа толмаған адамдарға вакцинация жасалмайды.